

ANNEXE 5 | ESSENCES D'ARBRES ET D'ARBUSTES PRECONISEES

ESSENCES PRECONISEES POUR LES HAIES BOCAGERES

Les essences suivantes sont recommandées et sont à privilégier au sein de l'espace public, au sein des stationnements et pour la mise en place d'alignements :

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Tilleuls	<i>Tilia sp., cordata...</i>
Erables	<i>Acer pseudoplatanus, negundo, macrophyllum...</i>
Sophora	<i>Sophora japonica</i>
Liquidambar	<i>Liquidambar styraciflua, orientalis</i>
Frêne	<i>Fraxinus</i>
Chêne	<i>Quercus rubra, robur, pubescens...</i>
Charmes	<i>Carpinus betulus</i>
Hêtres	<i>Fagus sylvatica</i>
Sorbier des oiseleurs	<i>Sorbus aucuparia</i>
Merisier à grappe	<i>Prunus padus</i>
Cerisier	<i>Prunus sp., cerasus, avium</i>

PLANTATION POUR LES PARCELLES A VOCATION D'HABITAT

Les essences suivantes sont recommandées dans le cadre de plantations d'arbustes d'ornement et de bandes plantées :

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>
Cornouiller blanc	<i>Cornus alba</i>
Fusain	<i>Eunonymus alatus</i>
Eleagnus	<i>Eleagnus ebbingei, sp</i>
Viorne lantane	<i>Viburnum lantana</i>
Viome obier	<i>Viburnum opulus</i>
Aubépine	<i>Crataegus monogyna</i>
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i>
Noisetiers	<i>Corylus avellana</i>
Néfliers	<i>Mespilus germanica</i>
Prunelliers	<i>Prunus spinosa</i>
Amélanchier	<i>Amelanchier ovalis, lamarckii</i>
Seringat	<i>Philadelphus coronarius</i>
Rosier	<i>Rosa sp., canina, glauca...</i>

Laurier tin	<i>Viburnum tinus</i>
Cytise	<i>Laburnum vulgare</i>
Houx	<i>Ilex aquifolium, altaclarensis</i>
Charme	<i>Carpinus betulus</i>
Groseiller à fleur	<i>Ribes sanguineum</i>
Lilas	<i>Syringa vulgaris</i>
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>
Millepertuis arbustif	<i>Hypericum sp.</i>
Epine vinette	<i>Berberis vulgaris</i>

Les essences suivantes sont recommandées dans le cadre de plantations de haies à caractère champêtre:

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>
Prunellier	<i>Prunus spinosa</i>
Troène	<i>Ligustrum vulgare</i>
Bourdiane	<i>Frangula vulgaris</i>
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>
Fusain	<i>Euonymus europaeus</i>
Viome lantane	<i>Viburnum lantana</i>
Eglantier	<i>Rosa canina</i>
Alisier blanc	<i>Sorbus aria</i>
Houx	<i>Ilex aquifolium, altaclarensis</i>
Aubépine	<i>Crataegus monogyna</i>
Merisier	<i>Prunus avium</i>
Sorbier	<i>Sorbus aucuparia</i>
Charme	<i>Carpinus betulus</i>
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i>
Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i>
Chêne	<i>Quercus robur, pubescens</i>
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>
Châtaignier	<i>Castanea sativa</i>

Les essences suivantes sont recommandées dans le cadre de plantations de couvre-sol et végétaux bas (bande plantée) :

Nom vernaculaire	Nom scientifique
Lierre	<i>Hedera helix</i>
Pervenche	<i>Vinca sp.</i>
Chèvrefeuille	<i>Lonicera nitida</i>

Millepertuis	<i>Hypericum perforatum</i>
Pachysandra	<i>Pachysandra terminalis, procumbens</i>
Viome	<i>Viburnum sp.</i>
Veronique	<i>Hebe veronique</i>
Corbeille d'argent	<i>Cerastium tomentosum</i>
Bruyère	<i>Erica</i>
Deutzia	<i>Deutzia sp., gracilis</i>
Sauge	<i>Salvia sp.</i>
Spirée	<i>Spiraea x vanhouttei, sp.</i>

ANNEXE 6 | ESSENCES INVASIVES A NE PAS PLANTER

ESSENCES INVASIVES

Les essences suivantes ne présentent pas ou peu d'aspects positifs pour les utilisateurs et ont des impacts négatifs importants et reconnus par tous. Tous les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent de ces espèces sont également inclus dans la liste suivante :

<i>Acacia dealbata</i> Link	mimosa d'hiver
<i>Acer negundo</i> L.	érable negundo
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ailante glanduleux
<i>Akebia quinata</i> Decne.	liane chocolat
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby	aulne à feuilles en cœur
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb	herbe à alligator
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	faux-indigo
<i>Aponogeton distachyos</i> L.f.	vanille d'eau
<i>Arundo donax</i> L.	canne de Provence
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	azolla fausse fougère
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	sénéçon en arbre
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	arbre à papillons
<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray	cabomba de Caroline
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	herbe de la Pampa
<i>Cotula coronopifolia</i> L.	cotule pied-de-corbeau
<i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne	crassule de Helm
<i>Egeria densa</i> Planch.	égérie dense
<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	jacinthe d'eau
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	olivier de Bohême
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	elodée du Canada
<i>Elodea nuttallii</i> (Planchon) St. John	elodée de Nuttall
<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	frêne rouge
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	févier d'Amérique
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	topinambour
<i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers.	hélianthe vivace
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	berce du Caucase
<i>Heracleum persicum</i> Desf. ex Fisch., 1841	berce de Perse
<i>Heracleum sosnowskyi</i> Mandenova	berce sosnowskyi

<i>Humulus japonicus</i> Siebold & Zucc.	houblon japonais
<i>Hydrilla verticillata</i> F.Muell.	hydrille verticillé
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> L.f.	hydrocotyle fausse-renoncule
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	balsamine de l'Himalaya
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss	grand lagarosiphon
<i>Lemna minuta</i> Kunth	lentille d'eau minuscule
<i>Lemna turionifera</i> Landolt	lentille d'eau à turions
<i>Ligustrum lucidum</i> W.T. Aiton	troëne de Chine / troëne luisant
<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	chèvrefeuille du Japon
<i>Ludwiga</i> sp.	jussies
<i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H.St.John	faux arum jaune
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	myriophylle du Brésil
<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michx.	myriophylle hétérophylle
<i>Parthenium hysterophorus</i> L., 1753	camomille balais
<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch	vigne vierge
<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	paulownia
<i>Periploca graeca</i> L.	bourreau des arbres
<i>Persicaria perfoliata</i>	renouée perfoliée
<i>Phyla nodiflora</i> var. <i>minor</i> (Gillies & Hook.) N.O'Leary & Múlgura	lippia
<i>Phytolacca americana</i> L.	raisin d'Amérique
<i>Pistia stratiotes</i> L.	laitue d'eau
<i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh.	platane à feuilles d'érable
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	laurier cerise
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach	noyer du Caucase
<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willd.) Sanjapa & Pradeep	vigne japonaise
<i>Reynoutria</i> sp.	renouées asiatiques
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	robinier faux-acacia
<i>Rubrivena polystachya</i> (C.F.W.Meissn.) M.Král, 1985	renouée à épis nombreux
<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	muguet des pampas
<i>Salvinia molesta</i> D.S.Mitch.	fougère d'eau
<i>Senecio angulatus</i> L. f., 1782	sénéçon anguleux
<i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth., 1859	flamboyant d'Hyères
<i>Solidago</i> sp.	solidages
<i>Spartina alterniflora</i> Loisel.	spartine à fleurs alternes
<i>Spartina patens</i> (Aiton) Muhl.	spartine étalée
<i>Spartina anglica</i> C.E. Hubb.	spartine anglaise
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br.	sporobole d'Inde
<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb.	tamaris d'été
<i>Vitis riparia</i> Michx.	vigne des rivages
<i>groupe d'espèces</i>	